



COVID-19 vaccination

Vejledning til gravide, ammende og par, som planlægger graviditet



Gravide og ammende kvinder anbefales ikke rutinemæssig vaccination*

- Sundhedsstyrelsens anbefaler ikke COVID-19 vaccination med Cominarty eller Moderna til gravide og ammende kvinder.
- Vaccination kan dog tilbydes efter en konkret lægefaglig vurdering, når de potentielle fordele vejer tungere end de potentielle risici for moderen og fosteret.
- Da indholdsstofferne i vaccinationen (mRNA) ikke integreres i cellernes arvemateriale, er der teoretisk ikke mistanke om øget risiko for hverken mor eller foster/barn, hvis moderen vaccineres.



Kvinder og par som ønsker graviditet/fertilitetsbehandling anbefales vaccination*

- Både kvinder og mænd anbefales COVID-19 vaccination uanset planlagt graviditet eller fertilitetsbehandling.
- Du kan tilmelde dig fertilitetsbehandling efter 2. vaccination.
- Da indholdsstofferne i vaccinationen (mRNA) ikke integreres i cellernes arvemateriale, er der teoretisk ikke mistanke om øget risiko for hverken mor eller foster/barn, hvis moderen vaccineres.

Hvis du var gravid på vaccinationstidspunktet

- Gravide der er blevet vaccineret i graviditeten anbefales at følge de normale graviditetskontroller.
- Hvis du bliver gravid mellem 1. og 2. dosis, anbefales det at afvente 2. dosis til efter fødslen.

*Aktuelt findes ikke kliniske studier med tilstrækkelig mængde data fra gravide kvinder til at belyse effekten af vaccinen og eventuelle bivirkninger eller forsterpåvirkning.

For yderligere information om COVID-19 vaccination, henvises til www.sst.dk/corona

Udarbejdet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Fertilitetsselskab, Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen.

Version 1: 25. januar 2021