

PATIENTVEJLEDNING

BARNLØSHED

Undersøgelser

Inden vi begynder behandling for barnløshed, er det vigtigt, at vi kender årsagen til barnløsheden.

1. Vi skal vide noget om Jeres generelle helbredstilstand, livstilsforhold (rygning, alkoholforbrug, overvægt m.m.) og eventuelle tidligere eller aktuelle sygdomme. Begge parter skal have taget blodprøve mhp. HIV og leverbetændelse og kvinden undersøges for immunitet for røde hunde. Hvis kvinden ikke er immun overfor røde hunde, skal hun vaccineres før behandling kan påbegyndes.
2. Vi skal undersøge, om kvinden får ægløsning. Dette kan gøres ved, at der tages en blodprøve 8 og 4 dage før forventet menstruation.
3. Passagen igennem æggeledeerne og livmoderhulen undersøges ved en undersøgelse betegnet HSU (se under patientvejledning).
4. Mandens sæd undersøges ved en sædanalyse.

Behandling

1. Hvis der ikke er ægløsning eller hvis blødningsintervallet er længere end 35 dage vil behandlingen bestå i at stimulere kvindens eget hormonsystem således, at hun får ægløsning.
2. Hvis der ikke er passage igennem æggeledeerne, vil kvinden blive tilbudt henvisning til en kikkertoperation, hvor man vil søge at korrigere forholdene således, at passagen genskabes. Kvinden kan også tilbydes henvisning til ægtransplantationsbehandling (IVF) på en offentlig fertilitetsklinik, såfremt parret ikke har et fælles barn. Hvis parret har et fælles barn, kan de vælge at betale for behandling på en privat klinik.
3. Hvis sædkvaliteten er let eller moderat nedsat, kan vi tilbyde inseminationsbehandling her i klinikken med mandens sæd.

- 4 Hvis sædkvaliteten er stærkt nedsat vil behandlingen være IVF evt. med mikroinsemination med mandens sæd eller behandling med donorsæd.
- 5 Hvis der ikke er nogen påviselig forklaring på barnløsheden, tilbydes insemination, og der tilbydes normalt tre behandlinger. Behandlingsresultater: ved hver behandling er der 15% chance for graviditet.

Prisen

Det er gratis at gå til behandling i klinikken, når man er henvist fra egen læge, også selvom i har fælles barn i forvejen. Medicinen, der skal bruges ved behandlingen er egenbetaling og for donorsæd, hvis det kommer på tale.